



แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อที่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง  
(Central line-associated with Bloodstream Infection :CLABSI)



ระบุการเฝ้าระวัง  ใส่สาย..... ระบุ ว/ด/ป..... เวลา .....

ถอดสาย..... ระบุ ว/ด/ป ..... เวลา .....

## ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

- 1) คาสายสวนหลอดเลือด > 48 hrs
- 2) มีรอยโรคติดเชื้อ ที่ผิวหนัง (lesion skin infection) เช่น Cellulitis, Abscess, Folliculitis
- 3) มีการติดเชื้ออื่น ๆ อยู่เดิม
- 4) มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
- 5). มี Active Bleeding ที่ ตำแหน่งของสาย(exit site)  6).อื่น ๆ ระบุ

เกณฑ์เฝ้าระวัง	D		E		N		D		E		N		D		E		N		
1.มีไข้ โดยไม่พบสาเหตุอื่น ในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี อาจมีอุณหภูมิต่ำกว่า 36.0 องศาเซลเซียส หายใจชั้วขณะ (apnea) หรือซีฟจรเต้นช้ากว่าปกติ																			
2.ผิวหนังบริเวณตำแหน่ง exit site แดง ร้อน																			
3.มี discharge ออกจาก exit site / แผลซึมแฉะ																			
4.ผ้าปิดแผลสกปรก เปียกชื้น มีเลือดซึมแฉะ																			
5.ผล Hemoculture 1 ตัวอย่างขึ้นเชื้อก่อโรค																			
6.หายใจเร็วขึ้น ความดันต่ำลง โดยไม่ทราบสาเหตุ																			

## หมายเหตุ

**พบเพียงข้อใดข้อหนึ่ง** ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ (ข้อ 3- 9 ให้ปฏิบัติตามแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทุกราย แม้ไม่พบความเสี่ยง)

- แจ้งแพทย์เจ้าของไข้ สงสัย CLABSI เพื่อพิจารณา ในการ
  - ส่ง H/C x 2sps, (Central line, Peripheral)  Swab รอบ exit site ส่ง G/S , C/S
  - พิจารณา empirical ATB
  - พิจารณา off Catheter หากไม่มีข้อบ่งชี้  พิจารณาเปลี่ยน Catheter หากไม่สามารถ off Cath ได้
- แจ้ง ICN ภายใน 24 ชั่วโมงโดยสามารถประสานงาน คุณซอซมพู่ พูนสูงเนิน หรือ คุณปาริชาติ ดอนบรรจง ได้ ในเวลาราชการ ได้ที่ เบอร์ภายใน 7720, นอกเวลาราชการให้แจ้งหัวหน้าหน่วย(และให้แจ้ง ICNเมื่อเปิดทำการ)

## กระบวนการดูแล

- การล้างมือ ตามหลัก 5 Moment เช่นการล้างมือ ก่อน ให้การดูแล ผู้ป่วย ก่อน-หลังการสัมผัส Catheterหรือทำหัตถการ
- ทบทวน กระบวนการดูแลตาม Bundle CLABSI
- การเช็ดข้อต่อทันทีด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมก่อนใช้แต่ละครั้ง เช่น 2% Chlorhexidine in alcohol 70% , providone iodine 70% Scrub the hub อย่างน้อย 15 วินาที และปล่อยให้แห้ง\*
  - ทำความสะอาดสาย หรือเปลี่ยนผ้าก๊อซ ทุกวัน ด้วยหลัก Aseptic technique
- สอนผู้ป่วยหรือญาติเรื่องการดูแลความสะอาด และเฝ้าระวังหากสายสกปรก ต้องแจ้งพยาบาล (ควรใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมแต่ละ
- ถ้ามี อาการหรืออาการแสดงการติดเชื้อ ให้เช็คอาการวันละ 1 ครั้ง จนกว่า H/C จะออกผล และรายงานแพทย์หากมีอาการ
- หากมี Sign exit site infection รายงานแพทย์เพื่อพิจารณา topical ATB หรือใช้วัสดุปิดแผลที่มียาฆ่าเชื้อ
- ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย สม่าเสมอ
- ถอดสายสวนเมื่อไม่มีข้อบ่งชี้ ในการใช้

ชื่อ-นามสกุล ..... อายุ ..... เพศ..... HN ..... AN .....

Ward ..... เตียง ..... แพทย์ .....